


Les Coulisses de la Pépinière #4

LA STRATIFICATION : UN HIVER (PRESQUE) MAITRISÉ

Si on rembobine...

D'ABORD LA COLLECTE DES FRUITS, PUIS ON LES LAISSE MURIR POUR POUVOIR EXTRAIRE LES GRAINES



Si on rembobine...

PUIS LE DÉPULPAGE :
EXTRACTION DES GRAINES ET SECHAGE



Prêtes pour la suite

LA STRATIFICATION !!!



La stratification : ???

C'EST SIMULER UNE SAISON D'HIVER, POUR QUE LA GRAINE D'ARBRE GERME LORS DU SEMIS SINON, RIEN NE SE PASSE : C'EST LA DORMANCE

A chaque espèce son cycle :
stratification chaude humide (20-25 °C)
et/ou froide humide (3-5°C)

		2026																									
NOM FRANCAIS	NOM LATIN	JUIN		JUILLET		AOUT		SEPT		OCT		NOV		DEC		JANV		FEV		MARS		AVRIL	
Merisier des oiseaux	*Prunus avium*				SC	SC	SF	SC	SF	SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Cerisier de Sainte Lucie	*Prunus mahaleb*				SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Camérisier à balais	*Lonicera xylosteum*							SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Chevrefeuille des bois	*Lonicera periclymenum*							SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Cerisier à grappes	*Prunus padus*					SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Nerprun alaterne	*Rhamnus alaternus*							SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Viorne lantane	*Viburnum lantana*							SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Sureau noir	*Sambucus nigra*					SC	SC	SC	SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Sureau à grappes	*Sambucus racemosa*					SC	SC	SC	SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Prunier myrobolan	*Prunus cerasifera*						SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Bourdaine	*Frangula alnus*							SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Cytise	*Laburnum anagyroides*																			Eb	S		
Micocoulier de Provence	*Celtis australis*									SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Prunier domestique*	*Prunus domestica subsp. insititia*							SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Poirier commun	*Pyrus communis subsp. pyraster*								SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S				
Cornouiller sanguin	*Cornus sanguinea*						SC	SC	SC	SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S		
Cornouiller mâle	*Cornus mas*						SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SF	SF	SF	SF	SF
Viorne obier	*Viburnum opulus*					SC	SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Prunellier	*Prunus spinosa*						SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Noisetier	*Corylus avellana*						SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S					
Tilleul à petites feuilles	*Tilia cordata*								SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SF	SF	SF
Charme commun	*Carpinus betulus*									SC	SC	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF	S		

Et en pratique ?

ON STRATIFIE LES GRAINES DANS UN MÉLANGE SABLE/TERREAU HUMIDE




Tout le monde en sac !

UNE QUANTITÉ DE SUBSTRAT ADAPTÉE AU NOMBRE ET A LA TAILLE DES GRAINES



Humidification

LÉGÈRE DU MÉLANGE GRAINE/SUBSTRAT



Prêtes pour le frigo !

BIEN FERMER LE SAC À ZIP
POUR GARDER L'HUMIDITÉ



Direction la chambre froide

AVEC LES COPINES



Ou le tapis chauffant

POUR LES GOURMANDES EN CHALEUR




Et bien sûr, traçabilité...

... QUAND TU NOUS TIENS !


mycorhize

Mon logiciel métier !



Et pendant l'hiver ??

OUVRIR LES SACS DE TEMPS EN TEMPS POUR BRASSER LES GRAINES ET LES OXYGÉNER : ELLES SONT VIVANTES !



Prochaine étape ?

LE SEMIS AU PRINTEMPS !
D'ICI LÀ, DODO...



On sèmera tout le contenu du sac (graines + substrat)
En attendant, patience !